

貧血に

ファイチ

販売名：ファイチ

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
使用期限（パッケージ側面およびビンラベルに記載）を
過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

貧血用薬

製品特徴

1. 吸収のよい溶性ピロリン酸第二鉄を主成分とし、効果的にヘモグロビンを造り、貧血を改善
2. 赤血球を造るのに必要な葉酸とビタミンB12をバランスよく配合
3. コーティング錠だから、鉄の味やニオイがしない
4. 腸で溶ける錠剤だから、効果的に成分を体内に吸収
5. 1日1回の服用で効く

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の貧血用薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 2週間くらい服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
便秘、下痢

効能・効果

貧血

用法・用量

次の量を食後に服用する

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	食後1回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)服用の前後30分はお茶・コーヒーなどを飲まないこと
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3)本品は水またはぬるま湯で、かまずに服用すること

成分・分量

(1日量:2錠中)

溶性ピロリン酸第二鉄……………79.5mg

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)……………50μg

葉酸……………2mg

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースフタル酸エステル、クエン酸トリエチル、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、赤色102号、カルナウバロウを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)品質保持のため、錠剤を取り出す時はキャップに取り、手に触れた錠剤は容器に戻さないこと
- (5)容器内の詰め物は、フタをあけた後は捨てること
(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものであるが、湿気を含み品質が変わるもととなる)
- (6)容器内の乾燥剤は服用しないこと

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元  **新製薬株式会社**
〒994-0069 山形県天童市清池東2-3-1

MADE IN JAPAN