

外用鎮痛
消炎剤

販売名:アンメルツゴールドEX NEO
External Anti-Inflammatory / Analgesic

△ 使用上の注意

☒ (してはいけないこと)

(守らない)と現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は使用しない

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しない

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)皮ふの弱い部位(顔、頭、わきの下等)
- (3)湿疹、かぶれ、傷口
- (4)みずむしたむし等又是化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しない

4. 長期連用しない



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談する

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)次の医薬品の投与を受けている人
ニーキノノン系抗酸剤

2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

接触皮炎、光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることがある。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがある
3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する	

第2類 医薬品

特 徴

- ①ジクロフェナクが患部に浸透、痛みを鎮める
- ②3種の血行促進成分がジンジン温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善
- ③l-メントール5%配合、爽快な使い心地

【成分・量】 100g中

ジクロフェナカナトリウム 1g
l-メントール 5g
トコフェロール酢酸エステル 100mg
ノナン酸バニリルアミド 12mg
ニコチノ酸ベンジルエステル 10mg
添加物として、グリルチルレチン酸、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレンジコール、ジプロピレングリコール、乳酸、エタノールを含む

【用法・用量】

1日3~4回、適量を患部に塗布する。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しない

【用法・用量に関する注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守する
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因となるいる病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用する
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しない
- (4)1週間にあたり50gを超えて使用しない
- (5)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う
- なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受ける
- (6)使用部位に他の外用剤を併用しない
- (7)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしない
- 皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しない
- スポーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリした刺激、痛みや熱感が増すことがあります
これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ず読むこと。また必要なときに読めるよう大切に保管すること

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとしめて箱に入れて立てて保管する
(2)小児の手の届かない所に保管する
(3)他の容器に入れ替えない(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4)火気には近づけない
(5)使用期限をすぎた製品は使用しない。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用する

●キャップをしっかりとしめないと液がもれることがある

●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗う

製品のお問合せは、お買い求めの店舗又はお客様相談室にお願いいたします

あつたらしいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

税控除対象

MADE IN JAPAN