

- 使用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ裏面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

■ 販売名 / アンメルツ温キューパッチ **外用消炎鎮痛剤**  
(Anti-Inflammatory / Analgesic Adhesive Patch) **第3類医薬品**

■ 特 徴

● 筋肉の血行をよくし、コリや痛みを治す温感タイプ ● 鎮痛消炎作用のある「サリチル酸グリコール」配合 ● 血行促進作用のある「ノニル酸ワニルアミド」配合 ● 抗炎症作用のある「グリチルレチン酸」配合 ● 無臭性

■ 成分・分量 膏体100g中

| 成分         | 分量    | はたらき   |
|------------|-------|--------|
| サリチル酸グリコール | 3.0 g | 鎮痛消炎作用 |
| l-メントール    | 7.0 g | 局所鎮痛作用 |
| グリチルレチン酸   | 0.19g | 抗炎症作用  |
| ノニル酸ワニルアミド | 0.10g | 血行促進作用 |

添加物として、BHT、生ゴム、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他1成分を含有する

■ 内 容 量 48枚(6枚×8シート)

製造番号  
  
使用期限  
(西暦年.月)

発売元  
**小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
製品のお問合せ先(お客様相談室)  
☎ 0120-5884-01  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
ホームページ | <http://www.kobayashi.co.jp>

**紙**

製造販売元  
**祐徳薬品工業株式会社**  
〒849-1393  
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)**

1. 次の部位には使用しないこと  
(1) 目や目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口

**👤 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状                       |
|------|---------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、ヒリヒリ感、痛み |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

■ 効能・効果 肩こり、腰痛、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

■ 用法・用量 1日数回患部に貼付してください

《用法・用量に関連する注意》  
 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること  
 (2) 貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないこと(3) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用すること ● 汗などをよく拭き取り、患部をきれいにしてから貼ること ● 皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて貼らないこと ● 体質によってはかぶれなどが生じることがあるので、風呂上がり直後の使用はさけること  
 ● 入浴の30分前には、はがすこと。また、貼ったままの入浴はさけること ● 定められた用法・用量を守ること

《保管および取り扱い上の注意》  
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密封して保管すること(2) 小児の手の届かなくところに保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) ● 開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管すること



MADE IN JAPAN