

成分・分量 100mL中

サリチル酸メチル 5000mg
 l-メントール 5200mg
 dl-カンフル 5200mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg
 チモール 700mg
 ノナン酸パニリルアミド 10mg

添加物として、プロピレングリコール、エタノール、フェニルエチルアルコールを含有する

効能・効果

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

用法・用量

患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3)外用にのみ使用すること

- 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
- 皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて使用しないこと

- スポーツや入浴など、汗をかき前後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します




製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いします

あつらいいな/をかたにする

発売元 **小林製薬株式会社**
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先 (お客様相談室)
 ☎ **0120-5884-01**
 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
 ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 **小林製薬株式会社**
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN



肩こり、筋肉痛

**アンメルツ
ヨコヨコ**

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

- キャップをしっかりとめないで液が漏れることがある
- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

副作用被害救済制度
 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品 82mL

販売名:アンメルツヨコヨコ



小林製薬

第3類医薬品

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
 また必要なときに読めるよう大切に保管してください
 使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
 過ぎた製品は使用しないこと

販売名:アンメルツヨコヨコ
 (External Anti-Inflammatory / Analgesic)

第3類医薬品

外用消炎鎮痛剤

特徴

1. とても塗りやすいタイプです
 アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分が曲がっているので、塗りにくい背中や腰の患部にでも、薬液がにじみ出るラバーキャップがピッタリと接し、スムーズに塗布することができます
2. どこでもむらなく適量を塗布できます
 ラバーキャップより適量の薬液がにじみ出ますので、どの患部にでも必要なだけ、適量を塗布できます
3. 塗りごこちのよいさわやかな薬剤です

使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜など
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨 **相談すること**

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

- 3 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること