使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルツヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品　**外用鎮痛消炎剤**

特　徴

1. とても塗りやすいタイプです
アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分が曲がっているので、塗りにくい背中や腰の患部にでも、薬液がにじみ出るラバーキャップがピッタリと接し、スムーズに塗布することができます

2. どこでもむらなく適量を塗布できます
ラバーキャップより適量の薬液がにじみ出ますので、どの患部にでも必要なだけ、適量を塗布できます

3. 塗りごこちのよいさわやかな薬剤です

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

3 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 100mL中

サリチル酸メチル	5000mg
l-メントール	5200mg
dl-カンフル	5200mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg
チモール	700mg
ノナン酸バニリルアミド	10mg

添加物として、プロピレングリコール、エタノール、フェニルエチルアルコールを含有する

効能・効果

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

用法・用量

患部に適量を塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
(3) 外用にのみ使用すること
●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
●皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと
●スポーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする
発売元　小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北4丁目6番

MADE IN JAPAN

肩こり、筋肉痛

アンメルツヨコヨコ

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（冷暗所）にキャップをしっかりしめて立てて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
●キャップをしっかりしめないと液が漏れることがある
●プラスチック製品（眼鏡わく、くし、便座等）、化繊の衣類、木材（塗料塗り家具、床等）、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

火気厳禁　第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

税控除対象