

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ裏面および容器ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

和漢生薬で
自然に近いお通じに

丸薬 七ふく

販売名:丸薬七ふく

便秘薬 第2類医薬品

製品特徴

「丸薬七ふく」は元禄3年(1690年)ごろ日本に生まれた「和漢薬」です
天然由来の植物成分をそのまま粉末にし、小粒の丸薬に仕上げています
特有の香りや風味があり、服用量(粒量)も多くなりますが、これらは原料
の効き目をそのまま生かすためです

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること
3. 大量に服用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を朝夕の空腹時に水またはお湯で服用してください
ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の
具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	15～30粒	2回
11才以上15才未満	10～20粒	
7才以上11才未満	7～15粒	
5才以上7才未満	5～10粒	
5才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
 - (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりしめること
 - (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 小さな丸薬ですので服用量を細かく調節できます。服用は空腹時・就寝前が効果的です。通常服用後8～12時間くらいでころよいお通じがごぞいます

成分・分量

60粒中

ダイオウ末	1000mg
アロエ末	340mg
ケンゴシ末	200mg
オウレン末	100mg
オウゴン末	200mg
センキュウ末	760mg
サンキライ末	1000mg


添加物として、バレイショデンブ、寒梅粉を含有する

- 本剤は天然物（生薬）を用いているため、丸薬の色が多少異なることがあります
- 丸薬の大きさや形は製造工程により多少不揃いで異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと

◆服用に際して



付属のスプーンですくって
ご使用ください
1回で10粒すくうことができます

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先（お客様相談室）
0120-5884-01
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3