

イラクナ

使用者向け解説書

ご使用前に必ずお読みください

このお薬についてのお問い合わせ先は？

製品のお問い合わせは、下記へお願いいたします。

小林製薬株式会社（お客様相談室）

0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

症状、副作用等のより詳しい質問がある場合は、
医師、薬剤師又は登録販売者にお問合わせください。

胃の動きを活発にし、胃もたれ、
胸やけに効く



第②類医薬品

販売名	イラクナ
有効成分名	イトプリド塩酸塩
含有量（1錠中）	50mg

 小林製薬株式会社

使用者向け情報提供資料について

使用者向け情報提供資料は、ご使用者の皆様や家族の方などに、医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を服用するときに特に知っていただきたいことを、添付文書をもとに、わかりやすく記載しています。

医薬品の服用による重大な副作用と考えられる場合には、直ちに服用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

このお薬の効果は？

このお薬は、胃の動きを活発にすることで、胃もたれ、胸やけなどの胃の不快症状を改善します。

このお薬は次の目的で服用いただけます。

胃もたれ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐

このお薬の使い方は？

次の量を食前に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	1錠	1日3回
15才未満	× 服用しないこと	

※服用に際しては、製品に同封されている添付文書を必ずお読みの上、定められた用法・用量を守って、正しくお使いください。

※錠剤を割らずにそのまま服用してください。

●どのように飲めばよいですか？

1回1錠をコップ1杯程度の水又はぬるま湯で飲んでください。

●食前とはいつのことですか？

食前とは、胃の中に食べ物が入っていないとき（食事の1時間～30分前）です。

●多く服用した際（過量服用時）にはどのようにしたらよいですか？

誤って多く服用した場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●食前に飲み忘れてしまった際にはどのようにしたらよいですか？

服用し忘れた場合は服用せずに、次の回に1回分を服用してください。

決して2回分を一度に服用しないでください。

●食後に誤って服用してしまった際にはどのようにしたらよいですか？

異常がある場合は医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●割って量を調節して服用してもよいですか？

錠剤に溝が入っていますが、割って量を調節して服用しないでください。

期待した効果が得られなかったり、作用が強くなる可能性があります。


●用法や用量を誤って服用してしまった際にはどのようにしたらよいですか？

異常がある場合は医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●錠剤の取り出し方は？

錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



このお薬を服用する前に確認すべきことは？

以下のチェックシートを使用して、本品が服用できることを確認してください。

イラクナ 第②類医薬品 適正使用のためのチェックシート

イラクナは胃の動きを活発にし、
胃もたれ、胸やけなどの症状を改善する胃腸薬です。
本剤を購入される前に必ず以下の項目を確認してください。
ご不明な点は薬剤師、又は登録販売者にご相談ください。

1 次の項目がひとつでも「YES」に該当する場合は、
本剤の服用はできませんのでご注意ください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の症状がひとつでもある人
原因不明の体重減少、繰り返す嘔吐、血便（黒いタール状の便）、発熱
- **妊婦又は妊娠していると思われる人**
- 15才未満の小児
- 次の医薬品を服用しており、中止できない人（本剤と併用できない薬です）
消化管運動機能改善薬（モサプリドクエン酸塩水和物、アコチアミド塩酸塩水和物等）、
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、ベタネコール塩化物を含有する胃腸薬、
乗り物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬
- 授乳中の人

YES	NO
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

ひとつでも「YES」がある場合は、
服用しないでください。

すべて「NO」の場合は
②へお進みください。

2 (1)の項目がすべて「NO」の場合
以下の場合に該当するか、更にご確認ください。ひとつでも「YES」に該当する場合は、
本剤が服用できない場合があるため、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- 医師の治療を受けている人
- 高齢者
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の診断を受けた人
腎臓病、肝臓病
- 次の病気にかかったことのある人
胃がん、胃・十二指腸潰瘍

YES	NO
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

ひとつでも「YES」がある場合は、本剤が服用できない場合
があるため、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

すべて「NO」の場合は、
本剤を服用いただけます。

前記の質問から服用可能な場合は、 次のことを必ず守ってください。

・定められた用法・用量を厳守してください。

・本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
消化管運動機能改善薬（モサプリドクエン酸塩水和物、アコチアミド塩酸塩水和物等）、
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、
ベタネコール塩化物を含有する胃腸薬、乗り物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬

・2週間服用しても症状の改善がみられない場合には、
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

・長期連用しないでください。

・服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、便秘、腹痛、吐き気、だ液の増加
精神神経系	ふるえ、頭痛、イライラ感、睡眠障害、めまい
循環器	動悸
その他	胸や背中の痛み、疲労感、乳汁分泌、無月経、 女性化乳房（男性に発症する女性のような乳房）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

このお薬の服用中に 気をつけなければならないことは？

- ・本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
消化管運動機能改善薬（モサプリドクエン酸塩水和物、アコチアミド塩酸塩水和物等）、
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、ベタネコール塩化物を含有する胃腸薬、
乗り物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬
- ・2週間服用しても症状の改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・長期連用しないでください。

このお薬の副作用は？

このお薬の服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります。
直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、便秘、腹痛、吐き気、だ液の増加
精神神経系	ふるえ、頭痛、イライラ感、睡眠障害、めまい
循環器	動悸
その他	胸や背中での痛み、疲労感、乳汁分泌、無月経、 女性化乳房（男性に発症する女性のような乳房）

まれに起こる、特にご注意ください副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じ時期にあらわれることが一般的です。症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止し、医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、 くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

このお薬に含まれているものは？

有効成分	1日量（3錠）中 イトブリド塩酸塩150mgを含有
添加物	乳糖、トウモロコシデンプン、CMC、無水ケイ酸、 ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、 酸化チタン、カルナウバロウ

その他

このお薬の保管方法は？

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- ・使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。