服用に際して、この添付文書を必ずお読みください また必要なときに読めるよう大切に保管してください 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

# コエキュア

第2類医薬品

漢方製剤

販売名:コエキュア

#### 特 徴

- ●早く治したい声がれ、のどの不快感を改善する医薬品です。
- ●漢方処方 "響声破笛丸" (きょうせいはてきがん) が、のどの奥の声帯の炎症を鎮め、声を 出しやすくしていきます

## / 使用上の注意

★ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

# 【相談すること】

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5)高齢者
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人 おくみ
- (8)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症  状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症  状
偽アルドステロン症、	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、
ミオパチー	脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が 見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談すること

軟便、下痢

- 4.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 効能・効果

しわがれ声、咽喉不快

注)体力に関わらず、使用できる

#### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
7才以上15才未満	2/3包	
7才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

### 成分·分量 1日量(3包:6.0g)中-

響声破笛丸料エキス…3.5g

レンギョウ ··········· 2.5g	キキョウ 2.5g	カンゾウ 2.5g
ダイオウ 1.0g	シュクシャ 1.0g	センキュウ 1.0g
カシ1.0g	アセンヤク 2.0g	ハッカ ······ 4.0g
		より抽出

添加物として、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、プロピレングリコール、トメントール、 スクラロース、乳糖を含有する

●本剤は天然物 (生薬) を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

小林製薬 お客様相談室 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 **0120-5884-01** 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) 製造販売元小林製薬株式会社 〒567-0057大阪府茨木市豊川1-30-3