

精気が萎える メンタル不調が続く方に

メンタフ錠

焦りや不安をやわらげて神経質を改善

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

成分・分量

1日量（10錠）中 桂枝加竜骨牡蠣湯エキス 2.3g

ケイヒ 2.0g、シャクヤク 2.0g、タイソウ 2.0g、ショウキョウ 0.5g、カンゾウ 1.0g、リュウゴツ 1.5g、ホレイ 1.5g
より抽出（添加物：無水ケイ酸を含む）

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸 Al、CMC-Ca、ステアリン酸 Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

用法・用量 次の量を食前又は食間、水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	5 錠	1 日 2 回
7才以上 15才未満	4 錠	
7才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます



50錠 5日分
(15才以上)

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

漢方製剤

第2類医薬品

販売名：メンタフ

△ 使用上の注意

■（相談すること）

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人：むくみ (6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 1ヶ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

MADE IN JAPAN