

Throat Disinfectant **第3類医薬品**

のど用殺菌消毒薬

販売名: のどぬーるスプレー EXクール  
 [効能・効果] のどの殺菌・消毒  
 [用法・用量] 1日数回、適量を患部に噴射してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2)小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目に入らないように注意すること(4)万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(5)のど用にのみ使用すること(6)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

[成分・分量] 100mL中

ヨウ素.....0.5g

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、l-メントールを含有する

**火気厳禁** 第二石油類 危険等級Ⅲ  
 プロピレングリコール含有物 水溶性

副作用被害救済制度  
 ☎0120-149-931

**△ 使用上の注意**

**⊗ (してはいけないこと)**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)甲状腺疾患のある人 (3)2才未満の乳幼児 (4)妊婦又は妊娠していると思われる人 (5)授乳中の人
2. **長期連用しないこと** 3. **大量に噴射しないこと**

**■ (相談すること)**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人: 口内のひどいただれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
 その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)火気に近づけないこと(プロピレングリコール含有物)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

**＼あつらいいな／をカタチにする**

発売元 **小林製薬株式会社**  
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
**製品のお問合せ先(お客様相談室)**  
**0120-5884-01**  
 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3