

## 第3類醫藥品

## 洗眼液 アイボンAL

販売名：アイボンAL d

## 使用注意事項

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 對藥物有過敏反應者
- (3) 有下列症狀者：眼睛劇烈疼痛
- (4) 被診斷為眼球乾燥症候群（乾眼症<sup>\*\*\*</sup>）者

<sup>\*\*\*</sup>以醫生診斷出病名者為前提

2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

## 功能、效果

清洗眼睛、預防眼部疾病（游泳後、灰塵或汗水進入眼睛等情況）

## 用法、用量

請每天3~6次，每次採用5mL進行洗眼

<用法與用量的注意事項>

1. 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
2. 請勿在佩戴隱形眼鏡的情況下使用  
另外，再次佩戴時，應在洗眼後間隔10~15分鐘左右
3. 洗眼杯請在使用前後用自來水充分清洗乾淨  
杯中殘留的水分建議自然風乾
4. 若藥液混濁，請勿使用
5. 僅限於洗眼使用

**成分、含量**

100mL 中

成分	含量	作用
$\epsilon$ -氨基己酸	300mg	消炎作用
甘草酸二鉀	25mg	消炎作用
馬來酸氯苯那敏	3mg	抗組織胺作用
硫酸鹽軟骨素	10mg	角膜保護作用

添加物：硼酸、硼砂、聚山梨醇酯 80、乙二胺四乙基二鈉、l-薄荷醇、d-冰片、pH 調節劑

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後裝入盒中，存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 洗眼杯請勿與他人共用

**使用方法**

- 洗過一隻眼的液體請勿用來洗另一隻眼
- 洗眼請勿超過 30 秒
- 如有佩戴隱形眼鏡，在使用前請務必取下隱形眼鏡
- 請在使用前將眼睛周圍的化妝品和污垢擦拭乾淨
- 由於保存狀態的影響，有時會在容器口周圍附著白色結晶。出現此情況時請用乾淨的紗布輕輕擦拭乾淨
- 未使用隱形眼鏡者也可以使用

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>