

第3类医药品

洗眼液 アイボン

販売名: アイボン d

使用注意事項

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 有下列症状的人: 眼睛剧烈疼痛
- (4) 被诊断为眼球干燥综合征(干眼症^{**})的人

^{**}以医生诊断出病名的人为前提

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持包装盒向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀

功能、效果

清洗眼睛, 预防眼部疾病(游完泳后, 灰尘或汗水进入眼睛等情况)

用法、用量

请每天3~6次, 每次使用5mL进行洗眼

<用法与用量的注意事项>

1. 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用
2. 请勿在佩戴隐形眼镜的情况下使用
另外, 再次佩戴时, 应在洗眼后间隔10~15分钟左右
3. 洗眼杯请在使用前后用自来水充分清洗干净
杯子中残留的水分建议自然干燥
4. 若药液浑浊, 请勿使用
5. 请仅限洗眼使用

成分、含量 100mL 中

成分	含量	作用
ε-氨基己酸	200mg	抗炎作用
尿囊素	30mg	角膜修复作用
甘草酸二钾	10mg	抗炎作用
马来酸氯苯那敏	3mg	抗组胺作用
盐酸吡哆醇(维生素 B ₆)	10mg	代谢促进作用
生育酚乙酸酯	5mg	血液循环促进作用
硫酸软骨素钠	50mg	角膜保护作用

辅料：硼酸、硼砂、聚山梨醇酯 80、依地酸钠、1-薄荷醇、d-冰片、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请拧紧瓶盖后装入盒中，保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 洗眼杯请勿与他人共用

使用方法

- 洗过一只眼的液体请勿用于另一只眼的冲洗
- 洗眼请勿超过 30 秒
- 佩戴有隐形眼镜的，请在使用前务必取下隐形眼镜
- 请在使用前将眼睛周围的化妆品和污物擦拭干净
- 由于保存状态的影响，有时会在瓶口周围附着白色的结晶。出现这种情况时请用洁净纱布轻轻擦拭干净
- 不使用隐形眼镜的人也可以使用

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>