

第3类医药品

眼药水 アイボントロ〜リ目薬ドライアイ

販売名: アイボン トローリ目薬 ドライアイ

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医师、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物过敏史的人
 - 有下列症状的人: 眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为以下疾病的人: 青光眼
- 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀、刺痛

- 出现以下情况, 请停止使用本药, 并持说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商
 - 眼花症状没有改善
 - 使用2周左右症状没有好转

功能、效果

泪液的辅助(眼睛干涩)、佩戴硬性隐形眼镜或软性隐形眼镜时的不适感、视疲劳、眼花(眼屎较多时等)

用法、用量

每天3~6次, 每次1~3滴, 滴眼使用。

<用法与用量的注意事项>

- 幼儿使用时, 请在监护人的指导下使用
- 容器的前端请勿触碰到眼睑、睫毛。若药液浑浊, 请勿使用
- 仅限滴眼使用
 - 由于保存状态的影响, 瓶口周围有时会附着白色结晶。这种情况下, 请用洁净纱布轻轻擦拭干净后使用
 - 滴眼后会暂时出现视野模糊的情况, 敬请注意

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
硫酸软骨素钠	500mg	保护角膜
氯化钾	50mg	泪液成分
氯化钠	300mg	泪液成分
羟丙甲纤维素	350mg	滋润保湿作用

辅料：硼酸、依地酸钠、山梨酸钾、PH 调整剂。

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿与他人共用

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>