

第3類醫藥品

眼藥水 アイボントロ～リ目薬ドライアイ

販売名：アイボン トローリ目薬 ドライアイ

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物有過敏反應者
 - (3) 有下列症狀者：眼睛劇烈疼痛
 - (4) 被診斷為以下疾病者：青光眼
2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|-------------|
| 皮膚 | 長疹子和發紅、發癢 |
| 眼睛 | 充血、發癢、腫脹、刺痛 |

3. 出現以下情況，請停止使用本藥，持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 眼花症狀沒有改善
 - (2) 使用2週左右症狀沒有好轉

功能、效果

淚液的輔助（眼睛乾澀）、佩戴硬式隱形眼鏡或軟式隱形眼鏡時的不適感、眼睛疲勞、眼花（眼屎多等）

用法、用量

請每天點3~6次，每次1~3滴，

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 容器的前端請勿觸碰到眼瞼、睫毛。另外，若藥液渾濁的話請勿使用
- (3) 請僅限點眼使用
 - 會因為保存的狀態，有時會在瓶口周圍附著白色的結晶。出現這種情況時，請用乾淨紗布等輕輕擦拭乾淨後使用
 - 點完之後會暫時出現視野模糊的情況，敬請注意

成分、含量

100mL 中

| 成分 | 含量 | 作用 |
|--------|-------|--------|
| 硫酸鹽軟骨素 | 500mg | 角膜保護作用 |
| 氯化鉀 | 50mg | 淚液成分 |
| 氯化鈉 | 300mg | 淚液成分 |
| 羥丙甲纖維素 | 350mg | 維持滋潤作用 |

添加物：硼酸、乙二胺四乙基二鈉、山梨酸鉀、PH 調節劑。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後，存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿與他人共用

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>