

第2类医药品

中药制剂 アルピタン

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 曾经因药物出现过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

- 若服用1个月左右（用于急性胃肠炎、宿醉时5~6次，用于水样性腹泻、中暑时5~6天）后，症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

不论体力如何均可服用，伴有口渴尿少、头痛、恶心、呕吐、眩晕、腹痛、浮肿等中任意症状的如下诸症：水样性腹泻、急性胃肠炎（里急后重请勿服用）、中暑、浮肿、头痛、宿醉

〈功能与效果相关的注意事项〉

里急后重是指有残便感，反复出现伴有腹痛的便意

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或两餐之间以水或温水送服

年龄	单次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
7岁以上不满15岁	2/3包	
4岁以上不满7岁	1/2包	
2岁以上不满4岁	1/3包	
不满2岁	× 不可服用	

〈用法与用量相关的注意事项〉

- 请严格遵守规定的用法、用量
- 幼儿请在监护人的监督指导下服用

●餐间是指“两餐之间”指餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量（3包：4.5g）中

含五苓散料提取物……2.3g

（从以下中草药中提取）

泽泻……5.0g

猪苓……3.0g

茯苓……3.0g

白术……3.0g

桂皮……2.0g

辅料：羟丙基纤维素、乳糖

●由于本品使用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- （1）请保管在避光阴凉干燥处
 - （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
 - （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
 - （4）1包分开服用时，剩余的药剂应折起袋口保管
- 此外，保管的剩余药剂要在当天服用或扔掉

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>