

## 第2类医药品

## 中药制剂 アルピタンγ（ガンマ）

販売名：アルピタンγ（茵陈五苓散）

## 使用注意事项

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 曾经因药物出现过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现右述症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

- 若服用1个月左右（呕吐、宿醉时5~6次）后，症状仍无好转，请停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

针对中等及中等以上体能者有口干、尿量少且有以下症状：呕吐、荨麻疹、宿醉、浮肿

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或两餐之间以水或温水送服

年龄	单次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	4片	1天2次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法、用量

- 餐间是指“两餐之间”指餐后约2~3小时
- 由于本剂用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

## 成分、含量

每日用量（8片）中 含茵陈五苓散料提取物・・・2.0g

〈从以下中草药中提取〉

泽泻・・・3.0g                      茯苓・・・2.25g

猪苓・・・2.25g                      白术・・・2.25g

桂皮・・・1.5g                      茵陈蒿・・・2.0g

辅料：无水硅酸、纤维素、玉米淀粉、CMC、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁

## 保管及使用注意事项

- (1) 请务必拉好封口拉链，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手接触本品

销售商 小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>