

第2類醫藥品

中藥製劑

アルピタン γ （ガンマ）販売名：アルピタン γ （茵陳五苓散）

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現右述症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

- 若服用約1個月左右（嘔吐、宿醉時則5~6次）症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

以體力中等以上為基準，有口乾、尿量少等以下症狀：嘔吐、蕁麻疹、宿醉、浮腫

用法、用量

飯前或餐間用溫水或水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	一天2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時
- 由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色多少會有差異

成分、含量

每天用量（8錠）中 含茵陳五苓散料萃取物 2.0g

<原生中藥換算量>

澤瀉……………3.0g	茯苓……………2.25g
豬苓……………2.25g	白朮……………2.25g
桂皮……………1.5g	茵陳蒿………2.0g

添加物：無水矽酸、纖維素、玉米澱粉、CMC、交聯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂

保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>