

## 第2类医药品

外用湿疹、皮炎用药

## アセモアパウダースプレー

販売名：アセモア

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位:

眼睛及眼睛周围、粘膜等

## 咨询事項

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 患部不干爽及溃烂严重的人
- (4) 患有或可能患有末梢血液循环障碍的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书咨询医生、药剂师或注册经销商

## 功能、效果

汗疹、溃烂、接触性皮炎、荨麻疹、发痒、皮炎、湿疹、蚊虫叮咬

## 用法、用量

请每天数次适量喷于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛,  
万一不慎入眼, 请立即用水或温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用
- (4) 内装有粉末, 使用前请摇晃均匀
- (5) 请在距患处约 10cm 的距离进行喷射
- (6) 使用后可能会出现冻伤, 所以请不要对同一部位连续喷射 1 秒以上

- (7) 请严格遵守规定的用法、用量  
 (8) 用于面部时，请不要直接喷射

### 成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
苯海拉明	0.1g	抑制瘙痒
利多卡因	0.2g	通过局部麻醉的作用缓解瘙痒
苯扎氯铵	0.01g	通过杀菌作用防止化脓
酸化锌	1.0g	使患处干燥，促进治愈

辅料：硬脂酸镁、肉豆蔻酸异丙酯、玉米淀粉、LPG

### 保管及使用注意事项

- (1) 请避免日光直射，在潮气小、阴凉处盖紧盖子保管
  - (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
  - (3) 请不要靠近火源
- 请不要放置在车内、日光直射的场所以及供暖器具（暖炉、暖风机等）附近，否则有温度上升造成破裂的危险
  - 请不要放置在温度达 40℃ 以上的场所
  - 在用水部位及潮气大的场所，罐体会生锈而产生孔洞，破裂现象，请勿放置。

### 注意避开火源和高温

- 废弃时请在没有火源的室外按下按钮排气，直至喷射声消失后再废弃
- 高压气体：LPG

销售商 小林制药株式会社  
 大阪市中央区道修町 4-4-10  
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>