

第2類醫藥品

止癢消炎藥

## アセモア a パウダージェル

販売名：アセモア a

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

請勿用於以下部位

眼睛及眼部周圍、黏膜等部位

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 對藥物曾有過敏反應者
  - (3) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
2. 使用後如出現下列症狀，可能是副作用，請立刻停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 若使用 5~6 天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

汗疹、潰瘍、長疹子、蕁麻疹、搔癢、皮膚炎、濕疹、蚊蟲叮咬、凍瘡

## 用法、用量

1 天好幾次、請塗抹在患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 孩童要使用時，請在成人的監護下使用
- (2) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (3) 本品僅限外用

**成分、含量**

100g 中

成分	含量	作用
苯海拉明	1g	抑制產生搔癢感
利多卡因	2g	具局部麻醉效果，可緩和搔癢感
異丙基甲基酚	0.1g	透過殺菌作用抑制雜菌的發生

添加物：1,3-丁二醇、二氧化矽、聚二甲基矽氧烷、羧乙烯基聚合物、乙氧基化氫化蓖麻油、磷酸、磷酸二氫鈉、磷酸氫鈉、對羥基苯甲酸

**保管及使用注意事項**

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>