

## 第2類醫藥品

外用濕疹、皮膚炎用藥

## アセモアパウダースプレー

販売名：アセモア

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

請勿用於以下部位

眼睛及眼部周圍、黏膜等部位

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 對藥物曾有過敏反應者
  - (3) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
  - (4) 有或可能有末梢血液循環障礙者
2. 使用後如出現下列症狀，可能是副作用，請立刻停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 若使用5~6天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

汗疹、潰瘍、長疹子、蕁麻疹、搔癢、皮膚炎、濕疹、蚊蟲叮咬

## 用法、用量

請每天數次適量噴於患部

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 孩童要使用時，請在成人的監護下使用
- (2) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (3) 本品僅限外用
- (4) 內含粉末藥劑，使用前請搖勻
- (5) 請在距患部約10cm的距離噴藥劑

- (6) 請避免對同一部位連續噴超過 1 秒，以免引發凍傷
- (7) 請遵守規定的用法、用量
- (8) 用於臉部時，請避免直接噴塗

### 成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
苯海拉明	0.1g	抑制產生搔癢感
利多卡因	0.2g	具局部麻醉效果，可緩和搔癢感
氯化本索寧	0.01g	具殺菌作用，可防止化膿
氧化鋅	1.0g	保持患部乾燥、加速治癒

添加物：硬脂酸鎂、肉豆蔻異丙酯、玉米澱粉、LPG

### 保管及使用注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請避免接近火源
- 請勿置於車內、陽光直射的場所或暖氣器具（暖爐、暖風扇等）等物品附近，以免因溫度上升而引起破裂的危險
- 請勿置於溫度超過 40°C 的地方
- 請勿置於家中常使用水的地方或潮濕的場所，以免瓶身因生鏽而產生破洞、裂痕

### 火源與高溫的相關注意事項

- 如要丟棄時請在沒有火源的戶外按下按鈕排氣，等噴射聲消失後再丟棄

高壓氣體:LPG

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>