

第2類醫藥品

皮膚外用藥

アットノン アオキュア

販売名：アオキュア

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

1. 下列人士請勿使用

容易出血或出血不易止住者

2. 請勿用於以下部位

（1）眼睛及眼部周圍、黏膜等部位（如，口腔、鼻腔、陰道等）

（2）損傷的皮膚

（3）濕疹、濕潤、接觸性皮膚炎、潰瘍

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

（1）正在接受醫生治療者

（2）曾對藥物等產生過敏反應者

（3）患部在臉部或範圍過大者

2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、刺激感、疼痛、感到發熱、輕微的刺痛感

3. 若使用1～2週後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

外傷（挫傷、扭傷等）引起的腫脹、內出血，燒燙傷、受傷引起的傷痕，凍瘡、手指的角質化、肩頸痠痛、肌肉痛。

用法、用量

請每天1～數次適量塗擦於患部，或塗在紗布上後貼於患部

<用法與用量相關注意事項>

（1）請每次使用後，蓋緊瓶蓋

（2）幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛
萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。
此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4) 本品僅限外用
- (5) 塗擦藥劑後請勿用保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋患部

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
聚乙稀磺酸鈉	1g	消除瘀血（血液凝滯不通）、促進血液循環、改善因挫傷而導致的瘀青及伴隨的內出血。
菸鹼酸苄酯	0.125g	有促進吸收的作用，提高聚乙稀磺酸鈉作用。

添加物：脂肪酸甘油酯、液態石蠟、辛基十二烷肉豆蔻酸酯、二十二醇、甘油、乙二胺四乙酸二鈉、對羥基苯甲酸酯

<成分與含量的注意事項>

本劑有促進血液循環的作用，塗擦後大約 10 分鐘左右可能出現皮膚變紅、感到溫熱，不過約莫 1~2 小時後會恢復正常

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放於乾燥、陰涼處，避免陽光直射
- (2) 請存放在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>