

## 第2类医药品

## 外用消炎镇痛剂 アンメルツヨコヨコEX

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用
  - (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
  - (2) 有哮喘病史的人
  - (3) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (4) 不满 15 岁的儿童
2. 请勿用于下列部位
  - (1) 眼睛周围、粘膜等部位
  - (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口
  - (3) 足癣、顽癣等或化脓的患部
3. 请勿长期连续使用

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、疼痛、刺痛感、热感、接触性皮炎

极少数患者会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

颈强直伴发的肩痛、肌肉痛、腰痛、关节疼痛、腱鞘炎（手、手腕、脚踝的疼痛和肿胀）、肘痛（网球肘等）、跌打、扭伤

## 用法、用量

1日2~4次，取适量涂于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (2) 本剂仅限外用
  - 请勿用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂布部位
  - 皮肤敏感的人请不要连续涂布于同一部位
  - 在运动和洗澡等出汗前后使用时，可能会有较强的刺激感、疼痛以及灼热感。上述症状较严重时，请用肥皂冲洗缓解

## 成分、含量

100ml 中

成分	含量
联苯乙酸	3g
1-薄荷醇	6g
马来酸氯苯吡胺	0.1g
壬酸香草酰胺	12mg

辅料：甘草酸、丙二醇、二异丙醇胺、pH调整剂、BHT、乙醇

## 保管及使用注意事项

- (1) 请将盖子盖紧，直立存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
  - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
  - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
  - 如果沾染到衣物上，请尽快按照各衣物的洗涤标识进行清洗

## 严禁烟火

第二石油类 危险等级III 乙醇含有物

销售商：小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页：<https://www.kobayashi.co.jp>