

## 第2類醫藥品

外用消炎鎮痛劑

## アンメルツヨコココEX

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
  - (1) 對本劑或本劑成分曾有過敏反應者
  - (2) 曾經出現過哮喘者
  - (3) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (4) 不滿 15 歲的兒童
2. 請勿用於以下部位
  - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
  - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口
  - (3) 香港腳、癬等或化膿的部位
3. 請勿長期連續使用

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 對藥物曾有過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、疼痛、火辣感、熱感、接觸性皮炎

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

伴隨肩頸酸痛的肩痛、肌肉痛、腰痛、關節疼痛、腱鞘炎（手、手腕、腳踝的疼痛和腫脹）、肘痛（網球肘等）、瘀傷、扭傷

## 用法、用量

1天2~4次，取適量本劑塗抹於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (2) 本劑僅限外用
  - 塗抹部位請勿用保鮮膜等透氣性差的東西覆蓋
  - 皮膚較脆弱的人請勿在同一部位連續使用
  - 運動及洗澡等出汗前後使用時，有可能出現火辣辣的刺激感、疼痛感及熱感加重的情況。如果這些症狀較重，用肥皂沖洗即可緩和

## 成分、含量

100ml 中

成分	含量
聯苯乙酸	3g
1-薄荷醇	6g
馬來酸氯苯那敏	0.1g
諾香草胺	12mg

添加物：甘草次酸、丙二醇、二異丙醇胺、pH 調節劑、BHT、乙醇

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋，並直立存放在避免陽光直射的涼爽乾燥之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
  - 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
  - 如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

## 嚴禁火源

第二石油類 危險等級Ⅲ 乙醇含有物

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>