

第3类医药品

## 外用消炎镇痛剂 アンメルツレディーナ

販売名: アンメルツ レディーナ

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于下列部位

(1) 眼部周围、粘膜等部位

(2) 湿疹、接触性皮炎、伤口

## 咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

有药物等过敏史的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

| 相关部位 | 症状          |
|------|-------------|
| 皮肤   | 皮疹与发红、瘙痒、肿胀 |

3. 若使用 5~6 天后症状仍无改善, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

肩部酸痛、肌肉痛、肌肉疲劳、腰痛、挫伤、扭伤、关节疼痛

## 用法、用量

请每天数次, 取适量涂抹在患部

<用法与用量相关的注意事项>

(1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

(2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或温水清洗。此外, 如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗

(3) 本品仅限外用

● 请不要用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂布部位

● 皮肤特别敏感的人请不要在同一部位连续涂抹

● 刺痛的刺激感较严重时, 请用肥皂冲洗缓解

**成分、含量** 100mL 中

| 成分      | 含量      | 作用         |
|---------|---------|------------|
| 乙二醇水杨酸酯 | 2500 mg | 控制炎症，缓解疼痛  |
| 1-薄荷醇   | 3000 mg | 带来清凉感，缓解疼痛 |
| 马来酸氯苯那敏 | 100 mg  | 控制炎症       |
| 生育酚乙酸酯  | 100 mg  | 促进血液循环     |

辅料：丙二醇、二丙二醇、乙醇、香料

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，正立药瓶保管在避免阳光直射的阴凉干燥处（冷暗处）
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿靠近火源（含乙醇物质）
  - 请拧紧瓶盖，以防液体外漏
  - 本液体会损伤/污染塑料制品（眼镜框、梳子、马桶圈等）、化纤类衣物、木材（油漆家具、地板等）、皮革等制品，故请留意

销售商 小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>