

第3類醫藥品

外用消炎鎮痛劑

アンメルツレディーナ

販売名：アンメルツ レディーナ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 請勿用於以下部位
 - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
 - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口

諮詢事項

下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

1. 曾對藥物等產生過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	起疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肩頸痠痛、肌肉痛、肌肉疲勞、腰痛、挫傷、扭傷、關節疼痛

用法、用量

請以適當的量每天塗抹患部數次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅供外用
 - 請不要用保鮮膜等透氣性較差的物品覆蓋塗抹部位
 - 皮膚耐受力較弱者請不要連續塗抹於同一部位
 - 若刺痛感較強時，請用肥皂沖洗以紓緩不適

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
水楊酸乙二醇酯	2500 mg	抑制發炎，緩和疼痛
薄荷醇	3000 mg	帶來清涼感，緩和疼痛
馬來酸氯苯那敏	100 mg	抑制發炎
乙酸生育酚酯	100 mg	促進血液循環

添加物：丙二醇、二丙烯甘醇、乙醇、香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處（陰暗處），避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請不要靠近火源

（本產品含有乙醇）

- 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
- 塑膠製品（眼鏡框、梳子、馬桶蓋等）、化纖類衣物、木材（上塗料的傢俱、地板等）、皮革等製品如不小心沾染到本液體可能造成物品損壞或有污痕，敬請留意

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>