

第 2 类医药品

外用消炎镇痛剂

アンメルツゴールド EX NEO ロング グイ塗り

販売名:アンメルツゴールドEX NEO

使用注意事项

禁止事项

- (如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
1. 下列人群请勿使用
- (1) 对本品或本品成分有过敏史的人

(2) 有哮喘病史的人

(3) 孕妇或有可能妊娠的妇女

(4) 不满 15 岁的儿童
2. 请勿用于下列部位
- (1) 眼睛周围、粘膜等部位

(2) 皮肤敏感脆弱的部位 (面部、头部、腋下等)

(3) 湿疹、接触性皮炎、伤口

(4) 足癣、顽癣等或化脓的患部
3. 使用本品期间, 请勿使用其他外用消炎镇痛药
4. 请勿长期连续使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
- (1) 正在接受医生治疗的人

(2) 有药物过敏史的人

(3) 正在使用下列药品的人 新喹诺酮类抗菌药
2. 使用中或使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、疼痛、刺激感、热感、皮肤粗糙、脱屑 (如头皮屑、皴等皮肤脱落)、水疱、色素沉着

极少数患者会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
接触性皮炎 光线过敏症	涂抹部出现伴有强烈瘙痒的皮疹和发红、肿胀、刺激感、水疱・溃烂等剧烈的皮炎症状及色素沉着、白斑, 其中皮疹和发红、瘙痒等症状有时会遍及全身。此外, 暴露在阳光下的部位有时会出现症状或症状加重

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

颈强直伴发的肩痛、腰痛、关节疼痛、肌肉痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、肘痛（网球肘等）、跌打、扭伤

用法、用量

1 日 3~4 次，取适量涂于患部。需注意的是，请勿用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂布部位。此外，请勿并用含有本成分的其他外用剂

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本品不能治疗引发疼痛、肿胀等症状的疾病，而是治疗疼痛、肿胀等症状的药剂，因此仅限于出现症状时使用
 - (3) 本剂仅限外用，请勿服用
 - (4) 1 周使用量请勿超过 50g
 - (5) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
 - (6) 使用部位请勿并用其他外用剂
 - (7) 请勿使用透气性较差的物品（保鲜膜、矫正带等）覆盖上药部位
- 皮肤敏感的人请不要连续涂布于同一部位
 - 在运动和洗澡等出汗前后使用时，可能会有较强的刺激感、疼痛以及灼热感。上述症状较严重时，请用肥皂冲洗缓解

成分、含量

100g 中

双氯芬酸钠	1g
L - 薄荷醇	5g
醋酸生育酚酯	100mg
壬酸香草酰胺	12mg
烟酸苄酯	10mg

辅料：甘草酸、肉豆蔻酸异丙酯、丙二醇、二丙二醇、乳酸、乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请拧紧瓶盖后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处（冷暗处）
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿靠近火源
- (5) 请勿使用过期的产品。此外，即使在使用期限内，开封后也请尽快使用
- 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
- 如果沾染到衣物上，请尽快按照各衣物的洗涤标识进行清洗

严禁烟火

第一石油类 危险等级 II

乙醇含有物

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>