

## 第2類醫藥品

## 外用消炎鎮痛劑 アンメルツゴールド EX NEO ロング グイ塗り

販売名:アンメルツゴールド EX NEO

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守,可能導致現有症狀惡化,或易引發副作用)

- 1.下列人士請勿使用
  - (1) 對本劑或本劑成分曾有過敏反應者
  - (2) 曾經出現過哮喘者
  - (3) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (4) 不滿 15 歲的兒童
- 2.請勿用於以下部位
  - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
  - (2) 皮膚較脆弱的部位(臉部、頭部、腋下等)
  - (3) 濕疹、接觸性皮炎、傷口
  - (4) 香港腳、癬等或化膿的部位
- 3.使用本劑期間,請勿使用其他外用消炎鎮痛劑
- 4.請勿長期連續使用

## 諮詢事項

- 1.下列人士在使用前,請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 對藥物曾有過敏反應者
  - (3) 正在使用以下醫藥品的人 新喹諾酮類抗菌藥
- 2.使用中或使用後如出現下列症狀,因可能為副作用,請立即停止使用,並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、接觸性皮炎、腫脹、疼痛、刺激感、熱感、皮膚粗糙、脫屑(如頭皮屑、皸等皮膚脫落)、水泡、色素沉澱

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現,應立即接受醫生的診療

相關部位	症狀
休克(過敏性)	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮炎 光線過敏症	塗抹部出現伴隨強烈發癢的長疹子・發紅、腫脹、刺激感、水泡・潰瘍等劇烈的皮膚發炎症狀或出現色素沉澱、白斑;其中長疹子・發紅、發癢等症狀有時會遍及全身。此外,暴露在陽光下的部位可能會出現症狀或症狀加重。

3.如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

### 功能、效果

伴隨肩頸酸痛的肩痛、腰痛、關節疼痛、肌肉痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、肘痛（網球肘等）、瘀傷、扭傷

### 用法、用量

1 天 3~4 次，取適量本劑塗抹於患部

但是，塗抹部位請勿用保鮮膜等透氣性差的東西覆蓋。此外，請勿和含有本成分之其他外用劑同時使用

#### <用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 本劑並非治療引發疼痛、腫脹等症狀的疾病，僅是治療疼痛、腫脹等症狀的藥劑，因此僅限於出現症狀時使用
  - (3) 本劑僅限外用，請勿服用
  - (4) 1 週使用量請勿超過 50g
  - (5) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
  - (6) 使用部位請勿和其他外用劑同時使用
  - (7) 使用部位請勿用透氣性差的東西（保鮮膜、矯正帶等）覆蓋、密封
- 皮膚較脆弱的人請勿在同一部位連續使用
  - 運動及洗澡等出汗前後使用時，有可能出現火辣辣的刺激感、疼痛感及熱感加重的情況。如果這些症狀較重，用肥皂沖洗即可緩和

### 成分、含量

100g 中

雙氯芬酸鈉	1g
L-薄荷醇	5g
醋酸鹽維他命 E	100mg
諾香草胺	12mg
煙酸苄酯	10mg

添加物：甘草次酸、肉豆蔻酸異丙酯、丙二醇、二丙烯甘醇、乳酸、乙醇

### 保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處(陰涼處)，存放時請轉緊瓶蓋後，置入盒內並直立存放。
  - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
  - (3) 請勿換裝到其他容器中(可能造成誤用或者變質)
  - (4) 請避免接近火源
  - (5) 請勿使用過期的產品。此外，即使在使用期限內，開封後請儘快使用
- 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
  - 如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

### 嚴禁火源

第一石油類 危險等級 II  
乙醇含有物

銷售商 小林製藥株式會社  
大阪市中央區道修町 4-4-10  
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>