第 2 類醫藥品

外用消炎鎮痛劑　アンメルツゴールド EX NEO

販売名:アンメルツゴールドＥＸ　ＮＥＯ

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

1.下列人士請勿使用

（1）對本劑或本劑成分曾有過敏反應者

（2）曾經出現過哮喘者

（3）已懷有身孕或有可能懷孕的婦女

（4）不滿 15 歲的兒童

2.請勿用於以下部位

（1）眼部周圍、黏膜等部位

（2）皮膚較脆弱的部位（臉部、頭部、腋下等）

（3）濕疹、接觸性皮膚炎、傷口

（4）香港腳、癬等或化膿的部位

3.使用本劑期間，請勿使用其他外用消炎鎮痛劑

4.請勿長期連續使用

諮詢事項

1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

（1）正在接受醫生治療者

（2）對藥物曾有過敏反應者

（3）正在使用以下醫藥品的人　　新喹諾酮類抗菌藥

2.使用中或使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、接觸性皮膚炎、腫脹、疼痛、刺激感、熱感、皮膚粗糙、脫屑(如頭皮屑、皴等皮膚脫落)、水泡、色素沉澱

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

相關部位	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
接觸性皮膚炎 光線過敏症	塗抹部出現伴隨强烈發癢的長疹子・發紅、腫脹、刺激感、水泡・潰瘍等劇烈的皮膚發炎症狀或出現色素沉澱、白斑；其中長疹子・發红、發癢等症狀有時會遍及全身。此外，暴露在陽光下的部位可能會出現症狀或症狀加重。

3.如使用 5～6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

伴隨肩頸酸痛的肩痛、腰痛、關節疼痛、肌肉痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、肘痛（網球肘等）、瘀傷、扭傷

用法、用量

1 天 3～4 次，取適量本劑塗抹於患部

但是，塗抹部位請勿用保鮮膜等透氣性差的東西覆蓋。此外，請勿和含有本成分之其他外用劑同時使用

＜用法與用量的注意事項＞

（1）請嚴格遵守規定的用法與用量

（2）本劑並非治療引發疼痛、腫脹等症狀的疾病，僅是治療疼痛、腫脹等症狀的藥劑，因此僅限於出現症狀時使用

（3）本劑僅限外用，請勿服用

（4）1 週使用量請勿超過 50g

（5）請注意不要讓藥物跑進眼睛。若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫

（6）使用部位請勿和其他外用劑同時使用

（7）使用部位請勿用透氣性差的東西（保鮮膜、矯正帶等）覆蓋、密封

●皮膚較脆弱的人請勿在同一部位連續使用

●運動及洗澡等出汗前後使用時，有可能出現火辣辣的刺激感、疼痛感及熱感加重的情況。如果這些症狀較重，用肥皂沖洗即可緩和

成分、含量

100g 中

雙氯芬酸鈉	1g
L-薄荷醇	5g
醋酸鹽維他命 E	100mg
諾香草胺	12mg
煙酸苄酯	10mg

添加物：甘草次酸、肉豆蔻酸異丙酯、丙二醇、二丙烯甘醇、乳酸、乙醇

保管與使用相關注意事項

（1）請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處(陰涼處)，存放時請轉緊瓶蓋後，置入盒內並直立存放。

（2）請避免接近火源

（3）請保管在孩童拿不到的地方

（4）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

（5）請勿使用過期的產品。此外，即使在使用期限內，開封後請儘快使用

●請轉緊瓶蓋，以防液體外漏

●如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

嚴禁火源

第一石油類　危險等級Ⅱ

乙醇含有物

銷售商　小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。