

## 第3类医药品

## 外用消炎镇痛剂 アンメルツ温キューパッチ

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于下列部位
  - (1) 眼睛或眼睛周围、粘膜等部位
  - (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物等过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、肿胀、刺痛感、疼痛

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

颈强直、腰痛、跌打损伤、扭伤、关节疼痛、肌肉痛、肌肉疲劳、冻疮、骨折痛

## 用法、用量

请每日数次, 贴敷于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
  - (2) 贴敷的患部请勿用被炉及电热毯等加热
  - (3) 皮肤敏感的人在使用之前将 1~2cm 见方的小片贴敷在手腕内侧皮肤较弱的部位, 贴敷半天以上, 确认没有出现皮疹、发红、瘙痒、接触性皮炎等症状后使用
- 擦掉汗液, 清洁患部后贴敷
  - 皮肤敏感的人请不要持续贴敷于同一部位

- 因体质原因，有时会出现接触性皮炎，请勿在刚洗完澡后使用
- 洗澡 30 分钟之前应剥下本品。此外，请勿贴敷着本品洗澡
- 严守规定的用法、用量

### 成分、含量

膏体 100g 中

成分	含量	作用
乙二醇水杨酸酯	3.0 g	镇痛消炎作用
1-薄荷醇	7.0 g	局部镇痛作用
甘草次酸	0.19 g	抗炎作用
壬酸香草酰胺	0.10 g	促进血液循环作用

辅料：BHT、生橡胶、苯乙烯·异戊二烯·苯乙烯嵌段共聚物、聚丁烯、含其他 1 成分

### 保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
  - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
  - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 开封后应折起袋口，并放入盒内保管

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>