

第3類醫藥品

外用消炎鎮痛劑

アンメルツ温キューパッチ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

1.請勿用於以下部位

- (1) 眼睛及眼部周圍、黏膜等部位
- (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口

諮詢事項

1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 曾對藥物等產生過敏反應者

2.使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、接觸性皮炎、腫脹、刺痛感、疼痛

3.如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肩頸痠痛、腰痛、挫傷、扭傷、關節疼痛、肌肉痛、肌肉疲勞、凍瘡、骨折痛

用法、用量

1天數次，貼附於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 貼附的患部請勿用暖爐桌及電熱毯等加熱
- (3) 皮膚耐受力較弱者，請在使用前將1~2cm的小張方型貼片貼附在手腕內側皮膚較脆弱的部位，放置半天以上，確認沒有出現起疹子、發紅、發癢、接觸性皮炎等症狀再使用。

- 擦掉汗液等水分，清潔患部後黏貼
- 皮膚耐受力較弱者請勿在同一部位持續黏貼

- 因體質而異，有時會引起接觸性皮炎，請勿在剛洗完澡後使用
- 洗澡前 30 分鐘應撕下本品。此外，避免黏貼著本品洗澡
- 嚴守規定的用法、用量

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
水楊酸乙二醇酯	3.0 g	鎮痛消炎作用
薄荷醇	7.0 g	局部鎮痛作用
甘草酸	0.19 g	抗發炎作用
N-香草基王醯胺	0.10 g	促進血液循環作用。

添加物：BHT、天然橡膠、苯乙烯異戊二烯苯乙烯共聚物、聚丁烯、本品含有其他 1 項成分

保管與使用相關注意事項

- (1) 請密封存放於乾燥涼爽處，避免陽光直射
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 開封後袋口應反折，並置於盒內存放

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>