

第3类医药品

外用消炎镇痛剂 アンメルツヨコヨコ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于以下部位

(1) 眼部周围、粘膜等

(2) 湿疹、接触性皮炎、伤口

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

有药物过敏史的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、疼痛、发热、刺痛感

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

颈强直、肌肉痛、神经痛、腰痛、跌打伤、肌肉肿胀、风湿、冻疮

用法、用量

取适量涂于患部

<用法与用量相关的注意事项>

(1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

(2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗

(3) 本品仅限外用

● 请勿用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂布部位

● 皮肤敏感的人请不要连续涂布于同一部位

● 在运动和洗澡等出汗前后使用时, 可能会有较强的刺激感、疼痛以及灼热感。上述症状较严重时, 请用肥皂冲洗缓解

成分、含量

100ml 中

水杨酸甲酯 5000mg

L - 薄荷醇 5200mg

d1-樟脑 5200mg

马来酸氯苯吡胺 . . 100mg

百里香酚 700mg

壬酸香草酰胺 10mg

辅料：丙二醇、乙醇、苯乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处（冷暗处）
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿靠近火源

（本品含有乙醇）

- 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
- 本液体会损伤/污染塑料制品（眼镜框、梳子、马桶圈等）、化纤类衣物、木材（油漆油漆家私、床等）、皮革等制品，故请留意

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>