

第3類醫藥品

外用消炎鎮痛劑

アンメルツヨコヨコ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

- 1.請勿用於以下部位
 - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
 - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口

諮詢事項

- 1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
對藥物有過敏反應者
- 2.使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、疼痛、發熱、刺痛感

- 3.如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

肩頸酸痛、肌肉痛、神經痛、腰痛、瘀傷、肌肉腫脹、類風濕性關節炎、凍瘡

用法、用量

請以適當的量每天塗抹患部數次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅供外用
 - 請不要用保鮮膜等透氣性較差的物品覆蓋塗布部位
 - 皮膚特別敏感者請不要連續塗抹於同一部位
 - 在運動和洗澡等流汗前後使用時，可能會使刺激、疼痛灼熱感加重。上述症狀較嚴重時，請用肥皂沖洗使其舒緩

成分、含量

100mL 中

水楊酸甲酯	5000mg
L-薄荷醇	5200mg
dI-樟腦	5200mg
馬來酸氯苯那敏	100mg
百里酚	700mg
諾香草胺	10mg

添加物：丙二醇、乙醇、苯乙醇

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處（陰暗處）
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請不要靠近火源

（本產品含乙醇物質）

- 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
- 塑膠製品（眼鏡架、梳子、馬桶等）、化纖類衣物、木材（上漆的傢俱、地板等）、皮革等製品如不小心沾染到本液體可能造成物品損壞或有色斑，敬請留意

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>