

第2类医药品

皮肤外用薬 アットノン EXk かゆみ止めプラス

販売名: アットノン EXk

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板减少症、紫斑病等)的人
- (2) 即使极少量的出血也有可能引起严重后果的人(具有抑制血液凝固的作用, 有可能促进出血)
- (3) 特应性皮炎患者(即便症状轻微, 但根据医生的诊断, 需要接受适当治疗)

2. 请勿用于下列部位

眼睛和眼睛周围、粘膜(例如, 口腔、鼻腔、阴道等)

咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 患部不干爽和溃烂严重的人
- (4) 曾被医生诊断为特应性皮炎的患者

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

伤口及烧伤后的皮肤硬结、紧绷(面部除外)、手肘、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、手指的皸裂、手脚的开裂与龟裂、干皮病、幼儿的干性皮肤、冻伤(溃烂除外)、挫伤与扭伤后的肿胀、肌肉痛、关节痛

用法、用量

请每天 1~数次, 取适量涂于患部或涂抹在纱布等上后贴于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用

- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用水或者温水清洗。此外，如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3g	具有促进皮肤新陈代谢、促进血液循环、保湿的作用
甘草酸二钾	1.0g	抑制皮肤炎症
尿囊素	0.2g	帮助修复受损皮肤组织
苯海拉明	0.5g	抑制发痒

辅料：山梨醇硬脂酸酯、聚氧乙烯二十二烷基醚、硬脂醇、鲸蜡醇、凡士林、石蜡油、肉豆蔻酸异丙酯、二甲聚硅氧烷、1,3-丁二醇、甘油、黄原胶、聚羧乙烯、d1-吡咯烷酮羧酸钠、依地酸二钠、对羟基苯甲酸酯、L-薄荷醇、柠檬酸、三乙醇胺、香料

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>