第 2 類醫藥品

皮膚外用藥

アットノン EXk かゆみ止めプラス

販売名：アットノンＥＸｋ

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

1. 下列人士請勿使用
   (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑病等）者
   (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能）
   (3) 異位性皮膚炎者（即使症狀輕微，也需要在醫師指示下接受適當治療）
2. 請勿用於以下部位
   眼睛及眼部周圍、黏膜等部位（例如口腔、鼻腔、陰道等）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
   (1) 正在接受醫生治療者
   (2) 對藥物曾有過敏反應者
   (3) 皮膚潮濕和潰爛嚴重者
   (4) 醫師診斷患有異位性皮膚炎者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢、腫脹

3. 如使用 5～6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起（臉部除外）、手肘・膝蓋・腳後跟・腳踝的角化症、手指的乾燥、手腳皮膚裂開及龜裂 、乾皮症、幼兒的乾燥性皮膚、凍傷（潰爛除外）、撞傷與扭傷後的腫脹・肌肉痛・關節痛

用法、用量

請每天使用 1～數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼上

＜用法與用量的注意事項＞

(1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

(2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療

(3) 本品僅供外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
類肝素	0.3g	促進皮膚新陳代謝作用、促進血液循環作用、水分保持作用
甘草酸二鉀	1.0g	抑制肌膚的發炎
尿囊素	0.2g	協助受損皮膚組織的修復
苯海拉明	0.5g	抑制發癢

添加物：山梨醇硬脂酸酯、聚氧乙烯蘿基醚、硬脂醇、1-十六烷醇、凡士林、液態石蠟、肉豆蔻酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、1.3-丁二醇、甘油、黃原膠、聚羧乙烯、dl-鈉羥基皮酪烷酮、乙二胺四乙基二鈉、對羥基苯甲酸酯、薄荷醇、檸檬酸、三乙醇胺、香料

保管與使用相關注意事項

(1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處

(2) 請存放在幼兒拿不到的地方

(3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商　小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。