

第2類醫藥品

皮膚外用藥 **アットノン EXk かゆみ止めプラス**

販売名：アットノン EXk

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
 - (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑病等）者
 - (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能）
 - (3) 性皮膚炎患者（即使症狀輕微，也需要在醫師指示下接受適當治療）
2. 請勿用於以下部位
眼睛及眼部周圍、黏膜等部位（例如口腔、鼻腔、陰道等）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物曾有過敏反應者
 - (3) 皮膚潮濕和潰爛嚴重者
 - (4) 醫師診斷患有異位性皮膚炎者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢、腫脹

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起（臉部除外）、手肘・膝蓋・腳後跟・腳踝的角化症、手指的乾燥、手腳皮膚裂開及龜裂、乾皮症、幼兒的乾燥性皮膚、凍傷（潰爛除外）、撞傷與扭傷後的腫脹・肌肉痛・關節痛

用法、用量

請每天使用 1~數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼上

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅供外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
類肝素	0.3g	促進皮膚新陳代謝作用、促進血液循環作用、水分保持作用
甘草酸二鉀	1.0g	抑制肌膚的發炎
尿囊素	0.2g	協助受損皮膚組織的修復
苯海拉明	0.5g	抑制發癢

添加物：山梨醇硬脂酸酯、聚氧乙烯蘿基醚、硬脂醇、1-十六烷醇、凡士林、液態石蠟、肉豆蔻酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、1,3-丁二醇、甘油、黃原膠、聚羧乙烯、dl-鈉羥基皮酪烷酮、乙二胺四乙基二鈉、對羥基苯甲酸酯、薄荷醇、檸檬酸、三乙醇胺、香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>