

第2类医药品

外用消炎镇痛剂 アンメルシン 1%ヨコヨコ

販売名: アンメルシン 1%ヨコヨコ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用
 - (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
 - (2) 有哮喘病史的人
2. 请勿用于下列部位
 - (1) 眼睛周围、粘膜等
 - (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口
 - (3) 足癣、顽癣等, 或化脓的患部
3. 请勿长期连续使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

| 相关部位 | 症状 |
|------|------------------------------|
| 皮肤 | 皮疹与发红、瘙痒、肿胀、接触性皮炎、刺痛感、热感、干燥感 |

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

关节疼痛、腰痛、跌打伤、扭伤、肌肉痛、腱鞘炎(手、手腕疼痛)、肘部疼痛(网球肘等), 颈强直导致的肩痛

用法、用量

请取适量涂于患部, 1日最多4次

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 11 岁以上的儿童请在监护人的监督指导下使用
 - (2) 不满 11 岁的儿童禁止使用
 - (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用水或者温水清洗，
如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
 - (4) 本品仅限外用
 - (5) 每周使用量请勿超过 50ml
- 请不要用保鲜膜等透气性差的物品覆盖涂布部位
 - 敏感皮肤的人请不要连续涂布于同一部位
 - 同一部位请勿并用其他外用剂

| | |
|--------------|---------|
| 成分、含量 | 100ml 中 |
| 吲哚美辛 | 1000mg |
| L - 薄荷醇 | 3000mg |

辅料：甘草酸、苯甲醇、聚桂醇、碳酸丙烯酯、pH 调节剂、BHT、八乙酰基蔗糖、乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处（冷暗处）
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
 - (4) 请勿靠近火源（本品含有乙醇）
- 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
 - 本液体会损伤/污染塑料制品（眼镜框、梳子、马桶圈等）、化纤类衣物、木材（油漆家私、地板等）、皮革等制品，故请留意
 - 如果沾染到衣物上，请尽快按照各衣物的洗涤标识进行清洗

严禁烟火

第二石油类 危险等级III
乙醇含有物 水溶性

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>