

第2類醫藥品

外用消炎鎮痛劑 アンメルシン 1%ヨコヨコ

販売名：アンメルシン1%ヨコヨコ

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
 - (1) 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
 - (2) 曾經出現過哮喘者
2. 請勿用於以下部位
 - (1) 眼部周圍、黏膜等部位
 - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口
 - (3) 香港腳、癬等處，或化膿的患部
3. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 曾對藥物等產生過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、接觸性皮炎、刺痛感、感到發熱、乾燥感

3. 如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

關節疼痛、腰痛、挫傷、扭傷、肌肉痛、腱鞘炎（手與手腕的疼痛）、肘部疼痛（網球肘等），肩頸痠痛伴隨的肩痛

用法、用量

以1天4次為限，取適量本劑塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 要給 11 歲以上的兒童使用時，請在監護人的指導監督下使用
 - (2) 未滿 11 歲的兒童請勿使用
 - (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。
此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
 - (4) 本品僅限外用
 - (5) 每週使用量請勿超過 50ml
- 塗抹部位請勿用保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋
 - 皮膚耐受力較弱者請勿在同一部位連續使用
 - 同一部位請勿和其他外用劑同時使用

成分、含量 100ml 中

吡啶美辛 1000mg

薄荷醇 3000mg

添加物：甘草酸、苯甲醇、聚桂醇、碳酸丙烯酯、pH 調節劑、BHT、八乙酸蔗糖酯、乙醇

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放於乾燥、涼爽處（陰涼處），避免陽光直射
 - (2) 請存放在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
 - (4) 請不要靠近火源（本產品含有乙醇）
- 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
 - 塑膠製品（眼鏡框、梳子、馬桶蓋等）、化纖類衣物、木材（上塗料的傢俱、地板等）、皮革等製品如不小心沾染到本液體可能造成物品損壞或有污痕，敬請留意
 - 如果沾染在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標示進行清洗

嚴禁火源

第二石油類 危險等級Ⅲ

含有乙醇 水溶性

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>