第 2 类医药品

外用镇痛消炎剂

アンメルシン 1%ヨコヨコひろびろ

販売名：アンメルシン 1 %ヨコヨコ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用
   (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
   (2) 有哮喘病史的人
   (3) 不满 11 岁的儿童
2. 请勿用于下列部位
   (1) 眼部周围、粘膜等
   (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口
   (3) 足癣、体癣等或化脓的患处
3. 不要长期连续使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
   (1) 正在接受医生治疗的人
   (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
   (3) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺痛感、热感、干燥感、接触性皮炎

3. 若使用 5～6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

关节疼痛、腰痛、跌打损伤、扭伤、肌肉痛、腱鞘炎（手、手腕疼痛）、肘痛（网球肘等）、肩膀僵硬伴随的肩部疼痛

用法、用量

每天最多涂抹 4 次，请取适量涂抹于患处

<用法与用量相关的注意事项>

(1) 11 岁以上的儿童请在监护人的监督指导下使用

(2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗

(3) 本品仅限外用

(4) 每周使用量请勿超过 50ml

- 不要用保鲜膜等透气性差的物品覆盖涂抹的部位
- 皮肤特别敏感的人不要连续在同一部位使用
- 同一部位请勿并用其他外用剂

成分、含量

100ml 中

成分	含量
吲哚美辛	1000mg
1-薄荷醇	3000mg

辅料：甘草酸、苯甲醇、聚桂醇、碳酸丙烯酯、柠檬酸、pH 调节剂、BHT、八乙酰基蔗糖、乙醇

保管及使用注意事项

(1) 请将盖子盖紧，直立存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处

(2) 请将本品放在儿童接触不到的地方

(3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

(4) 请勿靠近火源（本品含有乙醇）

- 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏
- 液体接触到塑料制品（眼镜框、梳子、马桶座圈等）、化纤衣物、木材（涂有涂料的家具、地板等）和皮革等会导致损伤，或者产生污渍，敬请注意
- 如果沾染到衣物上，请尽快按照各衣物的洗涤标识进行清洗

严禁火源

第二石油类，危险等级III，乙醇含有物，水溶性

销售商 ： 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页: https://www.kobayashi.co.jp

中国語（簡体中文） 2025.07 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。