

## 第2類醫藥品

外用鎮痛消炎劑

## アンメルシン 1%ヨコヨコひろびろ

販売名：アンメルシン 1%ヨコヨコ

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士禁用
  - (1) 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
  - (2) 曾經出現過哮喘者
  - (3) 不滿 11 歲的兒童
2. 請勿用於以下部位
  - (1) 眼部周圍、黏膜等
  - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口
  - (3) 足癬、體癬等或化膿的患部
3. 請勿長期連續使用

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (3) 有藥物過敏史者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、火辣感覺、熱感、乾燥感、接觸性皮炎

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

關節疼痛、腰痛、跌打損傷、扭傷、肌肉痛、腱鞘炎（手、手腕的疼痛）、肘痛（網球肘等）、肩膀僵硬伴隨的肩膀疼痛

## 用法、用量

1 天最多 4 次，請適量塗抹於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 要給 11 歲以上的兒童使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 每週使用量請勿超過 50ml
  - 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋塗抹部位
  - 皮膚特別脆弱者，請勿持續用於相同處
  - 同一部位請勿和其他外用劑同時使用

## 成分、含量

100ml 中

成分	含量
吡哌美辛	1000mg
1-薄荷醇	3000mg

添加物：甘草次酸、苯甲醇、聚桂醇、碳酸丙烯酯、檸檬酸、pH 調節劑、BHT、八乙酸蔗糖酯、乙醇

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，直立保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)
- (4) 請不要靠近火源 (本產品含有乙醇)
  - 請轉緊瓶蓋，以防液體外漏
  - 液體沾到塑膠產品 (鏡框、梳子、便座等)、化纖衣物、木材 (塗有塗料的家具、地板等)、皮革等，可能損耗，或者產生污漬，敬請注意
  - 如果附著在衣物上，請迅速按照各衣物的洗滌標識進行清洗

**嚴禁火源**

第二石油類，危險等級Ⅲ，乙醇含有物，水溶性

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>