

第2類醫藥品

皮膚外用藥 **アットノン コンシーラータイプ**

販売名：アットノン t

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
 - (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑症等）者
 - (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能）
2. 請勿用於以下部位 眼睛及眼部周圍、黏膜等部位（例如口腔、鼻腔、陰道等）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
 - (3) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 如使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起（臉部除外）、手肘・膝蓋・腳後跟・腳踝的角化症、手指的乾燥、手腳皮膚裂開及龜裂、乾皮症、幼兒的乾燥性皮膚、凍傷（潰爛除外）、撞傷與扭傷後的腫脹・肌肉痛・關節痛

用法、用量

請每天使用1~數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼上

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請每次使用後，蓋緊瓶蓋
- (2) 兒童使用時，請在監護人的指導監督下使用

- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4) 本品僅供外用
- 請勿在出血的傷口上使用（有可能不易止血）
 - 請勿使用在結痂上

成分、含量 100g 中

成分	含量	作用
肝素	0.3g	有促進血液循環、抗發炎及保水作用。

添加物：鯨蠟硬脂醇、二十二醇、己基癸醇、微晶蠟、氧化鈦、高嶺土、滑石、皂土、單硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯蘿基醚、聚氧乙烯鯨蠟醚、D-山梨糖醇、偏磷酸鈉、對羥基苯甲酸酯、乙二胺四乙酸二鈉、氧化鐵、三氧化二鐵、pH 調整劑、其他 1 項成分

- 本藥劑因添加物的性質，添加成分有部分會變成液體滲出，但並不影響藥效、效果。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在乾燥、陰涼處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>