

第2类医药品

汉方油膜软膏 アピトベール

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

下列人群请勿使用

- (1) 对本品或本品成分有过敏史的人
- (2) 患部不干爽、溃烂、烫伤、外伤严重的人
- (3) 伤口化脓的人
- (4) 患部范围广的人

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
正在接受医生治疗的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

功能、效果

湿疹、皮炎、裂口、皲裂、冻疮、鸡眼、汗疹、溃烂、外伤、烧伤、痔核引起的疼痛、肛裂

用法、用量

清洁患部, 取适量本品直接涂抹于患部或在纱布或布片上, 均匀涂抹厚厚一层后贴敷在患部。

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 本品仅限外用
- (3) 请注意不要溅入眼睛

● 本品为紫红色软膏, 请注意不要沾染在衣物上

(本品的颜色源自有效成分紫根)

为了防止沾染, 建议涂抹软膏后用纱布等物盖住药膏

万一沾染到衣物等上, 请尽快按照洗涤标识进行清洗 (但有可能无法彻底洗掉)

有效的洗涤方法

如果是可在家庭里洗涤的衣物，建议使用弱碱性或中性液体洗涤剂直接涂在沾染处，放置 5 分钟左右后再进行手洗，然后用 40℃ 左右的温水漂洗

如果是无法在家庭里洗涤的衣物，建议送到干洗店清洗

成分、含量

100g 中	紫根	••••	6.2g	芝麻油	•	62.3g
	当归	••••	6.2g	猪油	•••	1.6g
	蜂蜡	•••	23.7g			

- 由于本品使用了天然物（中草药），因此软膏的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

- 如果本品发硬难以挤出药管，请将药管放入温水（约 30℃）中，待本品变软后使用

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>