

第2類醫藥品

漢方油膜軟膏

アピトベール

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
- (2) 濕潤、潰瘍、燒燙傷、外傷嚴重者
- (3) 傷口已化膿者
- (4) 患部範圍過大者

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
正在接受醫生治療者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

功能、效果

濕疹、皮膚炎、凍裂、龜裂、凍瘡、雞眼、汗疹、潰瘍、外傷、燒(燙)傷、痔瘡引起的疼痛、肛裂

用法、用量

清潔患部，取適量本劑直接塗抹患部或在紗布或布片上均勻塗上厚厚一層，貼敷在患部

<用法與用量相關注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 本品僅限外用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛
- 本品為紫紅色軟膏，請注意避免沾染到衣物
(本劑的顏色源自有效成分紫根)

為了防止染色，建議塗抹軟膏後用紗布等物蓋住藥膏

萬一不小心讓衣服沾染到顏色時，請迅速按照洗滌標示進行清洗(但有可能無法完全洗乾淨)

容易洗乾淨的洗衣方法

如果是可在家庭裡洗滌的衣物，建議使用弱鹼性或中性液體洗滌劑直接塗在染色處，放置 5 分鐘左右後手洗，然後用 40°C 左右的溫水沖洗

如果是無法在家庭裡洗滌的衣物，建議送到乾洗店清洗

成分、含量

100g 中	紫根 . . . 6.2g	芝麻油 . . . 62.3g
	當歸 . . . 6.2g	豬油 . . . 1.6g
	蜜蠟 . . . 23.7g	

- 由於本劑使用天然物（草藥），軟膏的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放於乾燥、陰涼處，避免陽光直射
- (2) 請存放在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

- 如果本劑變硬而不易擠出的話，請將藥管放入溫水（約 30°C）中，等本劑變軟後使用

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>