

## 第2類醫藥品

中藥製劑 **ポーコレンエージ+ (プラス)**

販売名：ポーコレンエージ+ 猪苓湯合四物湯錠

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 胃腸虛弱易腹瀉者
  - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食欲不振、胃部不適

- 服用後有可能出現下列症狀，若此類症狀持續或惡化，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢  
腹瀉
- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力不拘均可使用，皮膚乾燥、面無血色、無腸胃問題卻排尿異常、容易口渴者的下列症狀：排尿困難、排尿疼痛、殘尿感、頻尿

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	5錠	一天3次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

## 成分、含量

每天用量(15錠)中 含豬苓湯合四物湯萃取物 3300mg

<原生中藥換算量>

當歸	1.5g	芍藥	1.5g	川芎	1.5g
地黃	1.5g	豬苓	1.5g	茯苓	1.5g
滑石	1.5g	澤瀉	1.5g	明膠	1.5g

添加物：二氧化矽、CMC-Ca、交聯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、滑石、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、巴西棕櫚蠟

●本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑（錠劑受潮可能會導致變色）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>