

第2类医药品

中药制剂 **ビスラットアクリア EX**

販売名: ビスラットアクリア EX 防己黄耆湯錠

使用注意事項

咨询事项

以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 怀孕或有可能妊娠的妇女
- (3) 老年人
- (4) 曾因药物等引起过皮疹与发红、瘙痒等症状的人
- (5) 有以下症状的人: 浮肿
- (6) 诊断为患有以下疾病的患者: 高血压、心脏病、肾病

2. 服用后如出现下列症状, 可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

极少数患者可能会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯, 或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难, 并可观察到干咳、发热等现象, 上述症状突然出现或持续不止
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状, 并逐渐加重
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

3. 若服用1个月左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

4. 长期连续服用时, 请咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等程度以下, 有容易疲劳、出汗等倾向的以下各种病症: 肥胖症(肌肉松弛, 即水肿)、浮肿、因肥胖产生的关节肿胀和疼痛、多汗症

用法、用量

按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	5 片	2 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本品易受潮，因此每次服用后请盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量（10 片）中 含防己黄芪汤提取物 3.2g

<从以下中草药提取>

防己	5.0g	黄芪	5.0g
白术	3.0g	生姜	1.0g
大枣	3.0g	甘草	1.5g

辅料：二氧化硅、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、滑石、纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、巴西棕榈蜡

- 本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品（药片受潮后可能会变白）
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>