

第2類醫藥品

中藥製劑

ビスラット アクリア EX

販売名：アクリア EX

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 高齡者
 - 曾因藥物等引起長疹子、發紅、發癢等症狀者
 - 有下列症狀者：浮腫
 - 診斷為下列疾病的患者：高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、胃部不適

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
假性醛固酮增多症、肌病	強出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等程度以下，有容易疲勞、出汗等傾向的以下各種症狀：肥胖症（肌肉鬆弛，也就是所謂的水腫）、浮腫、因肥胖產生的關節腫脹和疼痛、多汗症

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	5 錠	1 天 2 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（10 錠）中 含防己黃耆湯萃取物 3.2g

<從以下藥材萃取>

防己	5.0g	黃耆	5.0g
白朮	3.0g	生薑	1.0g
大棗	3.0g	甘草	1.5g

添加物：二氧化矽、交聯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、滑石、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、巴西棕櫚蠟

- 本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑（藥錠碰水後可能變為白色）
- (5) 瓶中的充填物用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>