

第2类医药品

中药制剂 **ビスラットゴールドb**

販売名: ビスラット ゴールドb

使用注意事項

禁止事項 (若不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

- 服用本品期间, 请勿服用下列药品
其他腹泻剂(泻药)
- 哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时要停止哺乳

咨询事项

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 怀孕或有可能妊娠的妇女
 - 身体虚弱的人(体力衰弱的人、身体较弱的人)
 - 胃肠虚弱易腹泻的人
 - 曾因药物等引起过皮疹与发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状, 可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛

极少数患者可能会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯, 或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难, 并可观察到干咳、发热等现象, 上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 服用后可能会出现下列症状, 若该症状持续或加重, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
腹泻
- 若服用1个月左右后(因习惯性便秘、伴随高血压和肥胖的便秘而服用时为5~6天)症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力充沛，侧腹部到胸口处疼痛、有便秘倾向的以下症状：肥胖症、习惯性便秘、伴随高血压和肥胖的肩部僵硬、头痛、便秘、胃炎、神经症

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	5 片	2 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本品易受潮，因此每次服用后请盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量（10 片）中 含大柴胡汤提取物（1 / 2 量）2.0g

<从以下中草药提取>

柴胡	3.0g	半夏	2.0g
生姜	0.5g	黄芩	1.5g
芍药	1.5g	大枣	1.5g
枳实	1.0g	大黄	0.5g

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

- 本产品采用了天然中草药，因此片剂的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>