

中药制剂

ビスラットゴールド EX

販売名：ビスラットゴールド EX α 防風通聖散錠

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 服用本品期间, 请勿服用以下药品
其他腹泻剂(泻药)
2. 哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时要停止哺乳

咨询事項

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 身体虚弱的人(体力衰弱的人、身体较弱的人)
 - (4) 胃肠虚弱易腹泻的人
 - (5) 容易出汗的人
 - (6) 老年人
 - (7) 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
 - (8) 有以下症状的人: 浮肿、排尿困难
 - (9) 诊断为患有以下疾病的患者: 高血压、心脏病、肾病、甲状腺功能障碍
2. 服用后如出现下列症状, 可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心或呕吐、食欲不振、胃部不适、腹胀、伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛
精神神经系统	晕眩
其他	出汗、心悸、浮肿、头痛

本产品偶尔会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯, 或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难, 并可观察到干咳、发热等现象, 上述症状突然出现或持续不止
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状, 并逐渐加重
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等状况
肠系膜静脉硬化性肠炎	因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等状况

3. 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续或加重时，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商：腹泻、便秘
4. 若服用1个月左右后（因便秘而服用时为1周左右）症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
5. 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力充沛，腹部皮下脂肪较多、有便秘倾向的以下症状：肥胖症，伴随高血压和肥胖的心悸、肩部僵硬、潮热、浮肿、便秘、蓄脓症（鼻窦炎）、湿疹、皮炎、疙瘩（粉刺）

用法、用量

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	5片	2次
不满15岁	×	不可服用

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本品易受潮，因此每次服用后请务必盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量(10片)中

含防风通圣散提取物(50%量) 2.5g

<从以下中草药中提取>

当归	0.60g	芍药	0.60g
川芎	0.60g	山栀子	0.60g
连翘	0.60g	薄荷	0.60g
荆芥	0.60g	防风	0.60g
麻黄	0.60g	生姜	0.15g
大黄	0.75g	芒硝	0.75g
白术	1.00g	桔梗	1.00g
黄芩	1.00g	甘草	1.00g
石膏	1.00g	滑石	1.50g

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

- 本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>