

第2類醫藥品

中藥製劑

ビスラットゴールドb

販売名：ビスラット ゴールドb

使用注意事項

禁止事項（若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用）

1. 正在服用本藥劑的期間，請勿服用以下醫藥品
其他腹瀉劑（瀉藥）
2. 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑時請避免哺乳

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 身體虛弱者（體力衰退者、身體較弱者）
 - (4) 胃腸虛弱易腹瀉者
 - (5) 曾因藥物等引起長疹子、發紅、發癢等症狀者
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

3. 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：腹瀉
4. 若服用約1個月左右(因習慣性便秘、伴隨高血壓和伴隨肥胖的便秘而服用時為5~6天)症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力充沛人士，從側腹部到胸口一帶感到疼痛、有便秘傾向者的以下症狀：肥胖症、習慣性便秘、伴隨高血壓和肥胖的肩膀痠痛、頭痛、便秘、胃炎、精神官能症

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	5 錠	1 天 2 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（10 錠）中 含大柴胡湯萃取物（1/2 量）2.0g

<從以下藥材萃取>

柴胡	3.0g	半夏	2.0g
生薑	0.5g	黃芩	1.5g
芍藥	1.5g	大棗	1.5g
枳實	1.0g	大黃	0.5g

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、玉米澱粉

●由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色會有少許差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑
- (5) 瓶中的充填物用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>