

第3類醫藥品

皮膚軟化藥 チュメキユア

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

請勿用於以下部位

- （1）眼部周圍、黏膜等部位
- （2）刮傷等傷口、裂痕（龜裂）部位
- （3）皮膚像瘡痂一般剝離的部位
- （4）發炎部位（潰爛、紅腫處）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - （1）正在接受醫生治療者
 - （2）對藥物有過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、刺激感（疼痛、發熱、麻痺感）、皮膚像瘡痂一般剝離的狀態

3. 若使用2週左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

手指的粗糙、肘部・膝蓋・腳跟・腳踝的角化症、老人的乾皮症、鯊皮斑

用法、用量

1 天數次，請適量塗抹於患部

＜用法與用量的注意事項＞

- (1) 請嚴格遵守用法與用量
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (4) 本產品僅供外用
- (5) 本品並非化妝品，因此請僅對功能與效果項中規定的患部使用，請勿當作基礎化妝品而使用於臉部

成分、含量

100g 中

成分	含量
尿素	20.0 g
生育酚乙酸酯	2.0 g
甘草酸單鉍	0.5 g

添加物：角鯊烷、肉豆蔻酸異丙酯、聚氧乙烯烷醚、硬脂醇、甘油、丙二醇、液態石蠟、凡士林、二十二醇、白蜂蠟、硬脂酸、鯨蠟硬脂醇、聚山梨醇酯 60、山梨醇硬脂酸酯、水楊酸、聚二甲基矽氧烷、磷酸氫二鈉、磷酸二氫鈉、黃原膠、對羥基苯甲酸、乙二胺四乙基二鈉、三乙醇胺

保管與使用相關注意事項

- (1) 請不要用沾有本劑的手觸碰眼睛和黏膜
- (2) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (3) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (4) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>