

第2类医药品

清肠药 クレンジル

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时要停止哺乳

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 有药物过敏史的人
 - 身体虚弱的人(体力衰退的人、体弱的人)
 - 胃肠虚弱易腹泻的人
- 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛

- 服用后有可能出现下列症状, 如果这些症状持续或加重, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
腹泻
- 若服用2周左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

便秘、清肠(调理通便)、软便、胃部与腹部胀满感、食欲不振(食欲减退)、消化不良、胃弱、过食、过饮、烧心、积食、胸闷、恶心(反胃、宿醉、大醉引发的反胃、恶心)、呕吐

用法、用量

请按照以下剂量, 于餐前或餐后用水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	3粒胶囊	3次
11岁以上不满15岁	2粒胶囊	
不满11岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 幼儿应在监护人的监督指导下服用

成分、含量

每日用量（9粒胶囊）中

野桐提取物	0.5 g（中草药换算量 5 g）
童氏老鹳草提取物	0.2 g（中草药换算量 2 g）
芦荟粉末	0.15 g
大黄提取物	20 mg（中草药换算量 0.2 g）
药用炭	0.4 g

辅料：羟丙基纤维素、玉米淀粉、纤维素、磷酸氢钙、滑石、交联羧甲基纤维素钠、二氧化硅、红花籽油、甲基丙烯酸共聚物-L、明胶、月桂醇硫酸钠

- 本品采用了天然物（中草药），因此胶囊内容物的颜色会有少许差异
- 药用炭等有效成分有可能导致大便颜色改变，但无需担心

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
 - (2) 请放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 铝袋及 PTP 板有可能出现收缩现象，但不影响产品质量

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>